


「セロテック」

**CKISO**

免疫阻害法:クレアチニン酸-UV法

**■特 長**

- ・免疫阻害法による測定法です。
- ・アスコルビン酸、ビリルビン等の共存物質は通常の濃度では影響ありません。

**■測定原理**


\* R-1: 抗CK-M阻害抗体使用

**■測定条件(日立-7170の場合)**





ダブルカインティックモードの場合

SAMPLE: 10.3 μL

R-1: 180 μL R-2: 45 μL




分析法 : RATE A - 27-34, 11-16  
 波長(副/主) : 700/340  
 ABS.LIMIT : 20000-増加


**■試薬溶解後の安定性(8~12°C)****■直線性****■相関****serotec**

## ■血中共存物質の影響


アスコルビン酸




遊離型ビリルビン




抱合型(ジタウロ)ビリルビン



溶血ヘモグロビン



イントラファット



## ■同時再現性

CKISO

(単位:U/L)

|       | SERUM I | SERUM II |
|-------|---------|----------|
| N     | 20      | 20       |
| MEAN  | 32.0    | 141.1    |
| MIN   | 30      | 137      |
| MAX   | 34      | 144      |
| R     | 4       | 7        |
| SD    | 1.14    | 1.55     |
| CV(%) | 3.56    | 1.10     |

## ■包 装

| 製品コード   | 製品内容                                       | 包装形態          |
|---------|--|---------------|
| A404-00 | 抗体試液 20ml用×5<br>酵素試液 20ml×5<br>基質試液 15ml×2 | 20ml用セット      |
| A404-15 | 抗体試液 60ml用×2<br>酵素試液 60ml×2                | 60ml用×2 (R-I) |
| A404-25 | 基質試液 30ml×2                                | 30ml×2 (R-II) |
| A404-10 | 抗体試液 80ml用×2<br>酵素試液 80ml×2                | 80ml用×2 (R-I) |
| A404-20 | 基質試液 40ml×2                                | 40ml×2 (R-II) |

## ■参考基準範囲

血清 CK-MB 活性: 25U/L以下

(金井 他, 臨床検査法提要, 32版, 金原出版,  
p607. 2005. )

## ■貯法及び有効期間

2~10°C保存 製造後1ヵ年(抗体試薬は2ヵ年)

(開封後R-I:1ヵ月、R-II:2ヵ月)

※使用上の注意等は添付文書をご参照下さい。



株式会社 セロテック

お問い合わせ先 (企画開発室)

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

E-mail:kikaku@serotec.co.jp

'0802,1000